

¿Cómo se debe escoger un cirujano plástico?

Antes de tomar la decisión de realizarse una intervención quirúrgica, usted debe estar seguro de estar en el lugar adecuado y en buenas manos. Es importante tener en cuenta, que no todos los médicos son cirujanos y mucho menos cirujanos plásticos.

A la hora de tomar la decisión de realizarse una intervención quirúrgica, son muchos los aspectos que se deben tener en cuenta como: médico, clínica donde realiza las intervenciones, reconocimiento, experiencia, entre otros, todos estos aspectos, pueden garantizar resultados óptimos durante y después de la cirugía. La economía no debe ser el factor decisivo al momento de escoger un cirujano, debido a que es su vida la que está en juego.

Es importante que antes de la cirugía, aclare todas las inquietudes que puedan surgirle, tales como: tipos de implantes, tamaños, marca y procedencia, con el fin de evitar, que el médico busque minimizar costos en este aspecto y utilice materiales de baja calidad, los cuales pueden aumentar la posibilidad de futuras complicaciones.

Ginecomastia

Procedimiento:

Reduce las mamas excesivamente desarrolladas en hombres, mediante liposucción y/o la extracción del exceso de tejido glandular.

Duración:

De una hora y media a tres horas.

Anestesia:

Se administra anestesia general o sedación por vía intravenosa y anestesia local.

Necesidad de hospitalización:

Éste suele ser un procedimiento que requiere la hospitalización del paciente.

Posibles efectos secundarios:

Hematomas temporales, hinchazón, entumecimiento, dolores o sensaciones de quemadura.

Riesgos:

Infección, retención de fluidos, daños a la piel, ondulación o flacidez de la piel, asimetría, cambios de pigmentación, formación excesiva de cicatrices si se ha cortado el tejido, pérdida de la sensibilidad del pezón, irregularidades en el contorno y en algunos casos se requiere una segunda intervención para eliminar tejido adicional.

Recuperación:

El paciente podría volver a trabajar en siete días. Las actividades que requieran un mayor esfuerzo podrán retomarse entre dos y tres semanas. La sensación de tumefacción y los moratones desaparecerán en tres o seis meses.

Resultados:

Permanentes, aunque la pérdida de peso podría provocar que el tamaño del área aumentara de nuevo.